

کتوتیفن - حکیم

کتوتیفن

شربت ۱ میلی گرم در ۵ میلی لیتر

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه مصرف آن به دیگران خودداری نمایید.

راهنماییهای عمومی:

قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشک معالج مشورت نمایید:

- ۱- در صورت سابقه حساسیت به کتوتیفن یا مواد محافظ، رنگها، غذاها و غیره.
- ۲- در صورت ابتلا به دیابت و صرع.
- ۳- در صورت مصرف همزمان هر نوع داروی دیگر از جمله داروهای ضد دیابت خوراکی، آنتی هیستامین ها و داروهای خواب آور و آرام بخش.
- ۴- در دوران بارداری و شیردهی.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند ولی مقدار مصرف معمول کتوتیفن به شرح زیر است:

بزرگسالان: برای پیشگیری از آسم آتوپیک به صورت خوراکی ۵ میلی لیتر شربت (۱ میلی گرم کتوتیفن) دو بار در روز صبح و عصر تجویز می شود.

کودکان ۶ ماه تا ۳ سال: برای پیشگیری از آسم آتوپیک، به صورت خوراکی ۰/۲۵ میلی لیتر (۰/۰۵ میلی گرم کتوتیفن) به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ۲ بار در روز صبح و عصر تجویز می شود.
برای کودکان بزرگتر از ۳ سال مقدار مصرف مطابق بزرگسالان تجویز می گردد.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مطالعات کافی و کنترل شده ای در مورد مصرف کتوتیفن در بارداری انجام نشده است، کتوتیفن در شیرمادر منتشر می شود، بنابراین در دوران بارداری و شیردهی مصرف این دارو توصیه نمی گردد.

هشدارها:

- ۱- دوره درمان را کامل کنید و برای بررسی پیشرفت درمان به طور منظم به پزشک مراجعه نمایید.
- ۲- این دارو در حملات آسم استفاده نمی شود و فقط برای پیشگیری موثر است.
- ۳- مواردی از تحریک سیستم عصبی مرکزی شامل هيجان زدگی، بی قراری، بی خوابی بویژه در کودکان مشاهده شده است.
- ۴- این دارو ممکن است باعث خواب آلودگی و گیجی گردد لذا ضمن درمان با این دارو از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری نمایید.
- ۵- در صورت فراموشی مصرف یک نوبت دارو به محض یاد آوری آن را مصرف کنید اما اگر زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده است از نوبت فراموش شده چشم پوشی کرده و مقدار مصرف نوبت بعدی را نیز ۲ برابر نکنید.
- ۶- مصرف شربت کتوتیفن در بیماران دیابتی بایستی با احتیاط کامل همراه باشد زیرا ممکن است غلظت قند خون را تغییر دهد.
- ۷- این فرآورده حاوی ۲ درصد اتانل می باشد.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته گردد، اگر چه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. عوارض کتوتیفن که نیاز به توجه پزشکی دارند عبارتند از:

عوارض با شیوع بیشتر: عفونت تنفسی، علائم سرماخوردگی مثل تب، لرز، سردرد، اسهال، سرفه و ناراحتی عمومی بدن

عوارض با شیوع کم: التهاب مئانه، تورم و التهاب، تشنج و اریتم مولتی فرم، هیپاتیت، صرع.

عوارض جانبی که فقط در صورت تداوم نیاز به توجه پزشکی دارند عبارتند از:

عارضه شایعتر: افزایش وزن

عوارض با شیوع کم: درد شکمی، تحریک سیستم عصبی مرکزی، گیجی، خشکی دهان، خون دماغ، افزایش اشتها، راش پوستی، بی خوابی، تورم پلک چشم.

تداخل دارویی:

مصرف همزمان کتوتیفن با داروهای ضد دیابت خوراکی، الکل، آنتی هیستامین ها و داروهای خواب آور و آرام بخش به علت تداخل اثر توصیه نمی شود.

سمومیت دارویی:

در صورت مصرف اتفاقی دارو بیش از مقدار توصیه شده و بروز علائمی از قبیل گیجی، عدم هوشیاری، تشنج، افزایش ضربان قلب و کاهش فشار خون بیمار را سریعاً به اولین مرکز درمانی انتقال دهید.

بسته بندی و شرایط نگهداری:

شربت کتوتیفن در بسته بندی یک بطری ۱۲۰ میلی لیتری در یک جعبه مقوایی عرضه می گردد.

شربت را دور از نور، رطوبت و دردمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کرده و از یخ زدگی محافظت نمایید.

دارو را دور از دید و دسترس اطفال نگهداری نمایید.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

Reference:

USP DI 2007 / Vol. II / pages: 1768 - 1770